

Observation sur la fièvre radicale de
l'hydroule par les fontiques.

M^r Louis. Un fourrier du Régiment de Navarre est entré
à l'hôpital militaire de Tania le 28. ^{bre} 1777.
ayant un gonflement assez considérable au Protum
du Côté gauche, qui s'étendait depuis l'aisselle jusqu'à
la partie inférieure; je reconnus par l'examen que
j'eus de la maladie que C'était une hydroule par épanche-
ment sans tumeur vaginale; m'étant informé
du malade, âgé de 36 ans, de la cause qui pouvoit
avoir donné naissance à cette maladie, il me dit que
deux semaines au mois de janvier dernier, il se
sente une tumeur sans tumeur, mais sans
le froid et fut vainement de efforts sans pouvoir
rendre une goutte d'urine; il éprouva de la tumeur
une douleur assez vive au Cordon spermatique du côté
droit, suivie d'un gonflement; on lui appliqua de nuit
des Compresses imbibées d'un à l'autre, et un sur-
pontoir qu'il porta jusqu'au mois de May, tout ou
la douleur et le gonflement se sont dissipés. Au mois
d'août il sentit une petite tumeur au Côté gauche, qui
augmenta ainsi que le gonflement; le chirurgien major
du Régiment lui lui appliqua des Cataplasmes émollients
et résolatifs, Comme ils ne produisirent aucun effet, et
que le gonflement augmentait, le malade entra à l'hôpital
au tiers de nuit 27 d'août; il fut purgé et mis
à l'usage d'une plume de canard de patiente sauvage
pour se soulager de la fièvre et de la douleur, pour
une incommodité étrangère à son hydroule. Comme
la maladie étoit récente j'en jugeai à propos

ARC 16 d. 1^{re} 5



Je lui fis une ponction préparatoire, qui servit son
Soutien. Vint quand la maladie est ancienne. Le 17 octobre,
je lui appliquai une trainée de sérum à cautère
sur la partie latérale externe du Scrotum du côté
gauche, avec les précautions d'empêcher le remède
d'étendre son effet au-delà des limites que j'en avais
proposées; le cautère ayant produit son effet, je
recouvris le scarre avec un digestif doux et émollient
et m'fis l'ouverture du Scrotum que fûnt six heures
après l'application de l'appareil à cautère, et cela se
vint vite, mais le cautère ne se borne pas à
produire le scarre, sa pénétration porte son effet plus
loin; le 18 jour du Scrotum avec mon retour,
il m'est sorti une grande quantité d'eau, d'abord à l'air
blanc, puis d'un fœtus sanguinolent, la tunique
Vaginale était rougeâtre, j'en importai deux lambeaux
assez considérables et une grande partie de l'incision;
le testicule et le cordon étaient presque dans l'état
naturel; le premier grandement en fait avec de la
charpie simple, l'emplâtre de moutage, et un cataplasme
anodin, et le suspensoir pour soutenir tout; le
malade était tranquille, et ne souffrait qu'une légère
douleur, il fut mis à l'écuelle. Le 19 au matin je
trouvai une inflammation assez considérable au Scrotum,
du côté de l'opération seulement, ainsi qu'à la tunique
Vaginale, le testicule et le cordon étaient un peu plus
gonflés, le blessé éprouvait des douleurs vives et une
chaleur générale provenant de l'effusion d'irritation;
une saignée, l'usage d'un poison à douces natures,

Les lavements émollients, les cataplasmes emollients,
le liniment de la paille grasse avec du jus de charpie
refondue de jeune d'œuf frais, le tarre fut humecté
avec l'huile d'hippocras; tous les moyens ont empêché
le progrès de l'inflammation; de cinquante jours ce
malade étoit entièrement guéri, la suppuration
commençoit à se faire; de l'attachement et l'affaissement
des parties m'ont fait connoître l'état puéril ou l'état
fébrile, le tarre et le fœtus se trouvoient dans
l'état ordinaire; j'ai continué les Boissons, le paille
à être grasse avec de la charpie imbuë d'un mélange
d'orge avec du miel rosé, l'emplâtre de semelle et de
cataplasme emollient; la suppuration est devenue plus
abondante et d'une bonne qualité; plusieurs petits lambeaux
de charpie Vaginale se trouvoient isolés, j'en ai im-
portés, les mêmes pansements ont été continués; le Lo-
dunum a été totalement importé, les deux bords
de la paille se sont affaissés et rapprochés, la suppuration
a diminué, chaque jour j'importais des petites portions
de charpie Vaginale, j'importois qu'il se feroit
un refoulement et toutes les parties, on fait que
les adhérences sont fortes; l'eau d'orge a été continuée
et l'emplâtre de semelle. Le 16. la paille a été pansée
à sec, la Cicatrice faisoit des progrès, le malade
a été totalement guéri le 5. et est sorti de l'hôpital
le 16 du même mois. Cette observation m'a été
rapportée par un homme d'Escoyer
à l'Académie en 1776.



Observation Sur un coup d'épée de Sabre
à l'apartie interne moyenne et Supérieure de
l'avant-bras droit, qui a divisé l'artere Cubitale.

Un Sergent du régiment de Suédois, âgé d'environ
Cinquante quatre ans, d'un tempérament Sanguin Bilioux,
est entré à l'hôpital Militaire de Dorlis le 19 Juin 1777.
expose un coup d'épée de Sabre à l'apartie moyenne
interne et Supérieure de l'avant-bras droit; L'ouverture
qui était large par la pointe à fait un large trou ver-
sable d'un pouce un demi de long et a divisé le
muscle jusqu'à l'os. Dans le premier moment il y eut
une hémorragie considérable, que ses Camarades arrêtèrent
avec un mouchoir serré fort serré. Son Etat infirme ne
lui permit de l'apporter à l'hôpital que deux heures après
l'accident; Le chirurgien regarda son premier à examiner
l'abdomen, en ôtant le mouchoir l'hémorragie recommença
le sang sortit avec impétuosité et vint, il n'y eut point
de doute qu'une des Arteres de l'avant-bras ne fût ouverte,
Cet état Ous bien faire que de tamponner la plaie avec
des bandes imbibées d'eau de Stabel pour s'en rendre maître
du sang, il réussit effectivement pour le premier moment;
il employa un bandage bien comprimé pour le second
Lefeu de l'eau Stétique. Sublime à l'ord sans un
Etat d'infirmité et presque sans connaissance fut tranquille
quelques moments; Mais son estomach étant en état de
spasme par l'apaisement des Arteres qu'il avoit pu
provoquer le vomissement, les forces s'affaiblirent, et
l'hémorragie recommença; L'élève à l'ord appella
au secours, un chirurgien Supérieur à son grade arriva,
après l'apparut et suivit avec les mêmes procédés

Le 1^{er} de l'année de l'indivision, le sang a son pénétration
l'apparue, j'eurai ditout, excepté le tourment, j'eurai
l'aplaye avec du vin tude afin d'obtenir l'achute et de
l'achute extérieure; la circonférence de l'aplaye étoit tumescée.
La tumeur étoit irascible formant ainsi d'élévation, la
circonférence étoit noire; il étoit ainsi de l'apparue
qui étoit le sang artériel extravasé dans le tissu
cellulaire qui formoit une tumeur anévrysmatique; je
procédai au moyen de l'achute l'hémorragie et pour
ce effet, je substituai au tourment, une compresse longue
graduée que j'appliquai sur le trapez de l'artère brachiale,
je fis un bandage roulé qui de l'achute comprimit de la
partie supérieure vers l'inférieure, et par ce moyen valant
le bout du sang à l'endroit de l'artère divisée, que je reconnus
être la fistule; l'aplaye fut simple et
fait avec du charpie sec, et l'implanté de l'achute pour
rapprocher les bords de l'aplaye; les compresses étaient



J'ai vu servir Camphrée & ammoniac, & une Baucelaz
méthodique; l'extrémité fut mise dans une situation
ou l'écoulement se trouvoit plus libre que de l'ordinaire;
mais rien n'obtint d'infirmité des remèdes généraux
pour secourir l'efflu et moyens employés; six heures
après le pansement que j'ai vu & l'écriture, l'écoulement
sera diminué, le pus fut libre & fluide, le bras fut mis
à une diète rigoureuse, les phlegmes se relâchèrent & se rafraîchi-
sèrent, des lavements, des émollients, quatre saignées dans
vingt quatre heures, & enfin après les accidents,
il n'y eut plus d'hémorragie; l'appareil fut bandé
six fois par jour & on l'a vu Camphrée, & ne
fut tenu que de trois jours; le bras se trouvoit tranquille
& ne souffroit qu'un peu d'engourdissement dans l'étendue
de l'écoulement; l'appareil se relâcha & dans le fait je
trouvai le gonflement après près d'un volume, on s'occupait
au travail des ligaments du Bassin & du Sacrospinale;
les bras se relâchèrent & se trouvoient un peu écartés, il ne souffroit
une sécheresse roussâtre; les muscles s'infirmités & les
tumeurs qui étoient jaunes & bleues ammoniac & une
commune avec de l'écoulement; le même pansement
fut continué, l'appareil fut deux jours sans être
levé, ayant toujours l'attention de l'écoulement & de
l'écoulement, le malade étoit tranquille & ne souffroit
en rien douloureux; au troisième pansement je trouvai
l'écoulement diminué & amoindri, l'appareil se relâcha
un peu, les mêmes pansements ont été continués,
l'écoulement a été totalement résolu le quatorzième jour,
l'appareil est devenu simple & sans être levé; le

Bandage compressif subrat n'a été supprimé que
le vingt quatrième jour; les aliments ont été
donnés au bûne par degrés, il a été solidaire
quatre de suite sixième jour et est sorti de l'hôpital
le quarantième pour retourner à son village; toute
observation faite à Lappaz respecter que j'ai
en voyez à l'Académie en 1766.

Observation Sur une fracture Compliquée de la
partie Supérieure du Bras gauche, suivie de
phalange et de la séparation accidentelle de l'extrémité.

Le mois de May 1773. Le fils de Jean Charles
du Village de la Sive d'Orizzo, âgé de quatorze
ans, d'un tempérament bilieux et d'une faible com-
pulsion, s'étant tombé de très haut sur des rochers,
il se fracture le Bras gauche à l'apophyse moyenne
et Supérieure; cette fracture étoit oblique, compliquée
d'une playe Considérable et foudroyée; on appella
d'un des premiers médecins de la chirurgie de la Savoie
lequel de passage par méthodiquement, se contentant
d'appliquer un simple Bandage roulé, sans avoir
précédemment fait la dilatation, retiré les esquilles,
et fait une légère extension pour remettre les extrémités
des os en place; le jeune homme resta dans cet
Etat pendant cinq jours, au bout duquel tout
ou appela M. Muller chirurgien de la Sive
de Moriani, lequel trouva à son arrivée toute
l'extrémité tuméfiée et prête à tomber en mortification;



J'ai Sait dit M. Muller, si le Bandage étoit
trop serré, ou si c'est un effet d'un accident survenu
pendant les cinq premiers jours qui ont occasionné
le gonflement gangreneux avec plusieurs points de
mortification qui paroissent déjà sans toute
l'étendue du bras et du bras-bas, particulièrement
dans le voisinage de la fracture; l'après un examen
scrupuleux, Lechirurgien annonce la nécessité de
l'amputation, ou une mort prochaine, si son
prognostic; le malade ayant encore des forces suffisantes
pour supporter l'opération; Mais M. Muller des
aux parents du Bessé qu'il n'avoit point d'instruments
suffisants pour une pareille opération, qu'il ne
pourroit même l'entreprendre, sans l'aide et le secours
de personnes éclairées, ne l'ayant jamais faite et
ne faire. Le père et les parents du malade s'oppos-
eront à l'opération et ne veulent jamais consentir
qu'elle soit faite; Ils prièrent seulement M. Muller
d'essayer d'obtenir quelque soulagement; Voyant
leur obstination et pour ne pas laisser le malade
sans secours, il ordonna un Liniment Composé
de Storax, de Sassafras et de Sel Cambré, et
donna les parents firent Morte; huit ^{Jours} après
avec le remède. Vers la mortification à l'endroit
de la fracture, M. Muller vit le cinquième de troisième
jours après l'opération, et si son bras n'est pas
lanciné, soit par l'effet du remède, soit par
tous les deux ensemble, la partie mortifiée ^{tomba} d'elle
même, il se fit une séparation et l'extrémité

à l'endroit fracturé, sans qu'il soit survenu aucune
hémorragie; la portion de l'humeur qui restoit étoit
garnie d'un pontet en bec de flûte d'un pouce et demi
de long et exécuté de vison de chair. on employa
à cet effet l'aube pommée qu'un peu de charpie, trempée
dans le lait séché; mesure que la Cicatrice avança.
L'os devenu plus ferme, non par totalité du
cylindre des os, mais la pointe qui faisait partie de
l'obliquité de la fracture. M. Muller étant éloigné du
malade de trois semaines, il crut que la portion d'os
existant s'exfolierait par la suite future; un
ser parut subite, tachant de se son Meur, fut
surpris d'être dérangé, après l'avoir examiné,
il jugea à propos de lui faire la portion d'os avec une
fine fine pour il faisait usage d'une sonnette,
ce qui produisit un effet heureux; le trentième jour
on continua d'appliquer sur la plaie et sur l'os
la charpie, le 38^e. la Cicatrice fut parfaite et soignée,
le jeune homme jouissant d'une bonne santé.
J'ai eu occasion de voir M. Muller dans la pièce
d'oreille qui m'a fait part de l'état où s'est trouvé
le blessé, que j'ai eu occasion d'examiner; je trouvais
la Cicatrice bien faite, l'os enfoncé dans les chairs,
ne me venoit pas imaginer au premier coup d'œil que
cette amputation accidentelle m'eût été faite sans le
secours de Dieu. Voilà une cure étonnante ou l'on
néanmoins point en danger; point de saigner ni
de régime ni de pansements méthodiques, l'enfant doit-
être être traité à l'instinct des parents, mais il



pour Courir qu'il soit son estropié à l'ignorance
du premier chirurgien, et au jeu de sa main qui lui
a donné le coup.

Observation Sur un Coup de feu pénétrant
dans la poitrine.

Un Soldat du Régiment de Languedoc, ayant
été blessé avec son arme et s'étant réfugié dans
les montagnes de la Corse, se trouva forcé par la
fuite de s'enfoncer pour chercher de quoi se faire
suffire. Des gens pressés pour être à la poursuite
des brigands le rencontrèrent, n'ayant pu le prendre,
ils lui tirèrent plusieurs coups de fusil, un sur le
ventre; la balle avoit son entrée à deux travers
de doigt au dessous de l'angle inférieur de l'omoplate
du côté droit et la sortie à la partie antérieure de
la poitrine au dessous du tétin du même côté. Le
Soldat tomba sur le coup, les plaies saignèrent
à vue d'œil; deux heures après le coup rien n'échappa
du sang abondamment, les douleurs de la poitrine
étaient vives et la respiration difficile, les accidents
n'ont laissé aucun doute que le coup ne fût pénétrant
dans la Cavité avec lésion du poulmon. Le
Mort fut porté dans la maison d'un paysan où
il ne reçut d'autre secours qu'un peu de pain, les
plaies furent lavées avec l'eau blanche et recouvertes
d'un peu de linge; pendant six jours il ne
reçut point d'autre traitement; le Crachement
de sang dura pendant huit heures et demie
la respiration se fit plus libre et les douleurs

Se dissiperum. Le onzième jour il fut remis entre
les mains de Lagartie et conduit à l'hôpital de
Narbonne où il arriva à dix heures du soir. Je le vis
un jour de l'indemain, il n'exprimoit aucune douleur, les
accidents étoient cessés, les plaies telles que la Rache
les avoient faites en un bon état, la suppuration d'une
bonne qualité, peu abondante; le Sujs étoit jeune
et vigoureux, il étoit plus inquiet de sa santé que
de sa fortune. Je continuai les pansements
simples et le régime soutenable. Le 18^e jour étant
solidement guéri il fut conduit à son régiment pour
y subir l'opération due à son crime.

On voit par ledit Cit. Citrus que débilité
s'est trouvée guérie sans de secours séculiers, point
de saignée, de potions, de phlegmes Vités en pareil
Cas, sans dilutions ny pansements Méthodiques,
L'opération seule à combattre les accidents et à conduire
le Cit. à une guérison aussi solide, que si l'on
eût employé tous les remèdes pour l'obtenir.
Les Corps rebelles à tout secours n'ont point
de chirurgiens pour les guérir lors qu'ils se trouvent
Munis; Les moines, Les femmes et Souverain des berges,
employant Souvent le même d'aufer la filature.
Le Régime est soumis à deux à l'essai; j'ai vu bien
d'observer Les Cures humides Capables d'étonner
les plus fameux praticiens. Quoi que guéri, il
faut cependant fournir, que de nombreux desintoxiques
en considérables.

Bourguignon chirurgien major Général de l'
Hôpitaux Militaires de France. &c. &c.
à Narbonne le 14^e Xbre 1777.



n.º 321.